V n.° 116.

1.° tubercule fistuleux au col.
2.° accouchement laborieux
terminé par le forceps.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Monsieur

rappellez vous, s'il vous plaist, un petit memoire qu'un
M.r vous a presenté au mois d'aoust 1775, a l'occasion
d'un tubercule fistuleux que sa demoiselle, agée de 18 ans,
porte a la partie anterieure du col, et pour lequel vous
avez conseillé le beurre d'antimoine mitigé par le
beaume de commandeur.

Soit deffaut d'intelligence de ma part, l'effet n'a pas
tout a fait repondu a votre attente; j'ai cependant
scrupuleusement suivis votre consultation, il n'est
arrivé non plus aucun accident par l'usage du caustique
quoique repeté autant de fois que je l'ai cru necessaire;
le tubercule subsistait neanmoins, mais moins gros,
l'etat inflammatoire de la plaie entretenu par le caustique
pouvait en etre la cause: le trou ayant disparu et les
chairs paraissant de niveau, il me vint a l'idée d'y
faire une lotion de beaume benedictin, qui avait conso-
-lidé une fois la plaie; de la couvrir de taffetas gommé
et de seconder ces dessicatifs par un bandage
compressif. au bout de cinq a six jours j'eu la satis-
-faction de voir une belle cicatrice, cave dans l'endroit
de la fistule et sans tubercule dans le centre, ni
callosités sur ses bords: mais la pellicule etait si

ARC
29
d. 3
n.° 89

mince, et les chairs des environ sont si delicates que, craignant qu'un influx d'humeurs dans un tissu si lache ne fit repa-
-raitre la fistule, j'ai conseillé de porter le bandage le plus longtems possible; il a eté porté quinze jours. des festes et des ajustés. de ceremonies qui ne permettent pas de porter la coeffe a nouée qui cachait le bandage, obligerent de le quitter.
huits jours se sont écoulés pendant les quels le tubercule, s'est manifesté sans douleur vers le centre de la cicatrice; j'ai ordonné de porter le bandage la nuit, le tubercule a diminué sensiblement; mais la privation du bandage pendant le jour faisait perdre les avantages qu'on retirait de son appli-
-cation pendant la nuit. enfin la fistule s'est rouverte le douze de ce mois au soir, n'ayant restée fermée que trois semaines. j'étais present, la personne s'en apperçu par un peu d'humidité; j'en fis l'examen et n'y ai vu qu'une excoriation imperceptible qui suintait une humeur claire, limpide et legerement glaireuse. la plus grande partie de la cicatrice est belle et bonne, tel est l'état actuelle de cette fistule.

en attendant votre reponse, Monsieur, je me propose de mettre la personne en état de paraitre a une feste nuptiale d'une de ses parentes, par le moyen que vous avez si heureusement employé pour la fistule du canal de Stenon: la pierre infernale, le taffetas gommé et l'application de mon bandage qui consiste en une petite

pelote de coton revetue de peau, cousue sur un lien qui
s'attache a un serre-tete.

je ne doute pas que ces moyens ne nous donnent une
cicatrice ; mais sera-t-elle durable ? car je ne pense
pas que nous ayons ici la breche d'un canal a boucher.
je presume que, si la personne avait assez de perseverance
l'usage continué du bandage, dut-il durer six mois et il
plus, obliterrait enfin les petits vaisseaux, et rendrait la
cicatrice permanente, au reste ce n'est qu'une pres° deux
vos lumieres me sont assez connuës pour oser m'en remettre
a moi meme.

j'ai l'honneur d'etre avec le plus profond res son sou
que

Monsieur

Votre tres humble et tres
obeisant serviteur Folch.ien

Chantoceaux ce 16 j.er 1776

je vous serais obligé de vouloir bien adresser votre
reponse a Mad.e Vandez Rue de Verdun (pour
m'etre remise) a Nantes.

NANTES

A Monsieur

Monsieur Louis, secrétaire
perpétuel de l'accademie royale
de chirurgie, rue des fossés S.t germ.
l'auxerrois, près la colonnade du louvre

A Paris.

125

permettez, Monsieur, que je vous fasse part en meme
temps d'un accouchement laborieux heureusement terminé
par le levier de roonhuisen, ou plutot une branche de
forceps droit monté solidement sur un manche de buis.
mardi 9 de ce mois etant dans une parroisse distante d'une
lieue de cet endroit, on m'appella sur les quatre heures
du soir pour une bourdiere agée de vingt et deux ans en travail
de son premier enfant depuis le six. une femme que l'on peut
appeller bouchère plutot que sage, avait fait depuis deux
jours des tentatives inutiles pour débarer (c'est son terme)
et extraire la tete avec ses mains, et cependant, selon son
raport, la tete n'était engagée au detroit superieur que
depuis le matin. je touchai la femme et trouvai des
dispositions a un enclavement qui n'était pas encore a son
point, mais d'autant moins inevitable que la femme, d'une
petite stature, avait les hanches si peu évasées que je n'en
ai point vu de pareils sur plus de 300 femmes depuis 15
ans. j'envoyai chercher mon levier, pendant ce temps le
travail subsistait encore, mais les douleurs s'affoiblissaient
et deux heures apres mon arrivée, la tete resta tout a fait
immobile. pour ne pas temoigner trop d'empressement et
par la meme menager l'esprit de la malade, je pris le parti
d'attendre encore une demi-heure au moment ou je reçu
mon instrument: ce temps écoulé je n'observais pour tout
changement que la diminution des douleurs et des forces de

la malade et les signes de l'enclavement le plus complet; alors
je resolu d'operer, ayant pour cela fait situer et tenir la
malade par les assistants, je presentai mon levier d'abord du
coté gauche de la mere avec les precautions conseillées en pareil
cas; ce ne fut pas sans peine que je le fis parvenir jusque sur
l'angle inferieur gauche de la machoire de l'enfant qui se presentait
la face en dessous: alors par des efforts gradués, secondés de
quelques legeres douleurs, ma main gauche servant de point
d'appui a mon instrument, je tirai de toutes mes forces et ainsi
trois fois inutilement. je fis sortir mon levier et je le presentai
du coté droit, mais je ne pus jamais l'y faire entrer; je le reportai
encore a gauche, nouveaux efforts infructueux, son introduction
seulement fut plus aisée: je tentai de l'introduire a droite et en
dessous, la convexité de mon instrument repondant a la
concavité de la ligne, qui separe les deux bassins, par l'illeum,
a l'endroit de son union a l'os sacrum; sa concavité embras-
-sant la joue droite de l'enfant et son extremité portant sur
le menton: cette introduction quoique penible ne fut point
douloureuse a la mere: j'augurai bien de cette position, mais
je craignais pour l'enfant; enfin je fis quelques efforts qui
occasionnerent une contraction de la matrice plus forte qu'é-
-auparavant, en effet j'apperçu la tete s'avancer un peu,
je redoublai graduellement mes efforts et de cette fois la
tete sortit, mon instrument placé comme je l'ai dit en dernier lieu,
excepté que dans la manoeuvre de ce coté, ma main droite servait
de point d'apui. les epaules me donnerent aussi quelques peines;

mais enfin l'enfant libre annonçat par des cris aigus qu'il
etait plein de vie et rendit le calme a la mere et aux
assistantes que l'employ de mes forces avaient effrayé.
l'enfant n'a aucunes marques; sa tete representait un cône
obtus dont la longeur etait de près de sept pouces, et le plus
grand diametre transversal etait de trois pouces et quelques
lignes.

Suivant les relations que j'ai dans ces pays je vois avec
déplaisir que M.r levret est trop peu connu, ses forceps
encore moins; et le levier regardé comme une chimere, une
chose inintelligible parmi les chirurgiens de ma classe, dont
le plus grand nombre ne connait que les crochets. mon
desir en vous communiquant mon observation n'est pas
qu'elle entre dans les fastes de la chirurgie; mais en la
repandant parmi les élèves de la derniere classe qui se destinent
au soulagement du laboureur ne pourraient-ils pas etre
encouragés par mon exemple? il n'arrive que trop de malheurs
dans les campagnes; pour ne pas vous ennuyer je ne vous en
raporterai qu'un de ceux qui sont a ma connaissance. il y
a un an environ que je fus appellé dans ce bourg meme
pour une femme de trente et quelques années, grosse de
son premier enfant et en travail; deux jours se passerent
sans qu'il eut fait de grands progrès, les douleurs etaient
éloignées, courtes et la femme avait peu de courage. une
voisine medisante sut me chasser d'auprès de la malade et me
fit remplacer par un ancien ~~qui~~ chirurgien de campagne

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

qui dans les cas difficiles n'a recours qu'a des frignets. il se fit accompagné le lendemain du medecin de celui ; je ne sçais comme ils opererent, mais l'enfant fut porté a l'église ayant le crane ouvert et perte de cerveau de la grosseur d'un œuf. cette manœuvre fut faite sur les dix a onze heures du matin et l'enfant ne mourut que vers le soir. la femme a cinq pieds passant, le bassin bien conformé, si ce n'est sa profondeur, encore n'exige-t-elle pas l'occision de l'enfant pour terminer. si ces M. M. avaient connu le forceps ou le levier, ce malheur serait-il arrivé? a six lieuës d'ici j'ai parlé du levier, on ne sçait ce que c'est ; le forceps est connu, mais M.r levret est si peu lu qu'on ignore qu'il s'est avantageusement servi lui meme d'une seule branche du forceps droit comme levier n'ayant pu se servir des deux.

Vous ferez, Monsieur, tel usage qu'il vous plaira de cette observation et de mes remarques, je ne les soumets point a votre censure, quoi que ce soit tout leur merite ; mais a votre correction, si vous en jugez le fond de quelqu'utilité pour le bien publique ; car tel sont mes vuës ; sous cette considera-tion je reclame votre indulgence, quand on n'a point fait d'etudes, peut-on sçavoir ecrire?